

## Analisi I, (Mir–Pet) A.A.2009–2010

### Dimostrazione di alcuni risultati non presenti sul libro di testo

**12/10/09**

Sappiamo che  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , e  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , con  $b_n \neq 0$ ,  $b \neq 0$ . Vogliamo mostrare che  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ .

Sappiamo che  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : n > n_\varepsilon \implies |a_n - a| < \varepsilon$  e  $\forall \varepsilon > 0 \exists n'_\varepsilon : n > n'_\varepsilon \implies |b_n - b| < \varepsilon$   
 $|b_n| = |(b_n - b) + b| \geq |b| - |b_n - b| \geq |b|/2$ , se  $|b_n - b| \leq |b|/2$ . Ciò è possibile se prendiamo  $\varepsilon < |b|/2$ . Si noti come essenziale sia avere  $b \neq 0$ . Possiamo quindi scrivere

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{a_n b - b_n a}{b b_n} \right| = \left| \frac{(a_n - a)b + a(b - b_n)}{b b_n} \right| \leq \frac{\varepsilon |b| + \varepsilon |a|}{|b| \frac{|b|}{2}} = 2 \frac{|a| + |b|}{b^2} \varepsilon$$

**16/11/09**

**Teorema 1. Derivata di una funzione composta** Siano  $f: [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$  e  $g: [a, b] \rightarrow [c, d]$  funzioni derivabili. Allora la funzione  $(f \circ g)(x)$  è derivabile anch'essa e  $(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$

*Dimostrazione* Usiamo la definizione di derivabilità  $h(z) = h(z_0) + h'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)$ . Scriviamo

$$\begin{aligned} f(g(x_0 + h)) - f(g(x_0)) &= f(g(x_0) + g'(x_0)h + o(h)) - f(g(x_0)) = \\ &= f(g(x_0)) + f'(g(x_0))(g'(x_0)h + o(h)) + o(g'(x_0)h + o(h)) - f(g(x_0)) = \\ &= f'(g(x_0))g'(x_0)h + f'(g(x_0))o(h) + o(g'(x_0)h + o(h)) \end{aligned}$$

Poi dividiamo tutto per  $h$  ed otteniamo

$$\frac{f(g(x_0 + h)) - f(g(x_0))}{h} = f'(g(x_0))g'(x_0) + \frac{f'(g(x_0))o(h) + o(g'(x_0)h + o(h))}{h}$$

Ora se  $g'(x_0) \neq 0$  abbiamo  $o(g'(x_0)h + o(h)) = o(g'(x_0)h) = o(h)$ . Infatti possiamo scrivere

$$\frac{o(g'(x_0)h + o(h))}{h} = \frac{o(g'(x_0)h + o(h))}{g'(x_0)h + o(h)} \frac{g'(x_0)h + o(h)}{h}$$

Il primo termine tende a zero per definizione di  $o(\cdot)$  ed il secondo tende a  $g'(x_0)$ .

Se invece  $g'(x_0) = 0$  abbiamo  $o(o(h)) = o(h)$  e questo sta sul libro. Il risultato è

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(g(x_0))o(h) + o(g'(x_0)h + o(h))}{h} = 0$$

ossia

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0 + h)) - f(g(x_0))}{h} = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

**Teorema 2. Relazione tra limite della derivata e limite del rapporto incrementale.**

Sia  $f:(a, b) \rightarrow \mathbf{R}$  derivabile e tale che esiste  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l \in \mathbf{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ . Allora

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = l$$

**Osservazione** Il significato del teorema è : se sappiamo che  $f$  è derivabile e possiamo calcolare  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l$ , allora  $l$  è il valore della la derivata di  $f$  in  $x_0$ .

**Osservazione** Se in un punto la funzione ammette solo derivata destra o sinistra le affermazioni valgono ugualmente ovviamente restringendosi ai limiti destro oppure sinistro. Ad esempio se la funzione è definita in  $[a, b]$  ed è derivabile, allora se esiste  $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = l^+$ , tale limite è la derivata in  $x = a$ .

*Dimostrazione* Chiaramente se  $x_0 = a$  si intende solo la derivata destra e sinistra se  $x_0 = b$ . Dal teorema di Lagrange abbiamo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = f'(c_h), \quad x_0 + \frac{h - |h|}{2} < c_h < x_0 + \frac{h + |h|}{2}$$

Dal teorema del confronto, se  $h \rightarrow 0$  abbiamo  $c_h \rightarrow 0$  e quindi  $f'(c_h) \rightarrow f'(x_0)$  mentre a destra abbiamo esattamente la derivata da cui il risultato. ■

Dal Teorema appena dimostrato segue che una funzione avente discontinuità di salto oppure eliminabile non può essere la derivata di alcuna funzione. Vediamo perché.

Supponiamo di avere una funzione  $h(x)$  con una discontinuità di salto in un punto  $x_0$  e quindi esistono i limiti  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l^\pm$  con  $l^+ \neq l^-$ . Supponiamo ora che tale funzione sia la derivata di una funzione  $H(x)$  ossia  $H'(x) = h(x)$  con  $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$  per un qualche  $\delta > 0$ . Possiamo dire che

1) esistono i limiti  $\lim_{x \rightarrow x_0} H'(x) = l^\pm$  per ipotesi in quanto  $H'(x) \equiv h(x)$

2) Dal teorema appena dimostrato segue che  $\lim_{x \rightarrow x_0} H'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0))$

Essendo però  $H(x)$  derivabile, deve essere  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0)) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0))$  ossia  $l^+ = l^-$  ma questo è escluso per ipotesi. Dalla contraddizione se ne esce dicendo che non esiste  $H(x)$  con le caratteristiche volute.

Supponiamo ora che una funzione avente *discontinuità eliminabile* sia la derivata prima di una funzione. Assumiamo quindi che  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x) = l$  ma  $h(x_0) \neq l$  e che esista

una funzione  $H(x)$  tale che  $H'(x) \equiv h(x)$  in un certo intorno di  $x_0$ . Stavolta abbiamo  $l^+ = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0))$  e  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0)) = l^-$  grazie al teorema ed  $l^+ = l^-$  per ipotesi di discontinuità eliminabile. Ma  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} (H(x_0 + h) - H(x_0)) = H'(x_0) = h(x_0) \neq l^+$  da cui la contraddizione.

Invece una funzione avente una discontinuità di seconda specie può benissimo essere la derivata di una funzione. Ad esempio la funzione  $h(x) = 2x \sin 1/x - \cos 1/x$  per  $x \neq 0$  e  $h(0) = 0$  (che ha una discontinuità di seconda specie nell'origine) è la derivata della funzione  $H(x) = x^2 \sin 1/x$  per  $x \neq 0$  e  $H(0) = 0$ . Il teorema in questo caso non dice nulla in quanto manca l'ipotesi fondamentale secondo cui esiste  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$  ( $h$  corrisponde a  $f'$  nel teorema 2).

18/11/2009

**Teorema 3.** Sia  $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  derivabile  $n$  volte. Allora  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k$  è l'unico polinomio per cui  $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$

*Dimostrazione* Dimostriamo solo l'unicità in quanto per l'esistenza, ossia il fatto che

Prima enunciamo un argomento teso a far capire come mai  $P_n(x)$  è unico.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$ , va bene quella del libro di testo. Per quanto riguarda l'unicità, supponiamo che esista un

polinomio  $T_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x - x_0)^k$ , diverso da  $P_n(x)$ , tale che  $f(x) - T_n(x) = o((x - x_0)^n)$ . Dire

che  $T_n(x) \neq P_n(x)$  equivale a dire che almeno uno dei coefficienti  $c_k$  è diverso dal corrispondente coefficiente  $f^{(k)}(x_0)/k!$ . Osserviamo

$$P_n(x) - T_n(x) = (P_n(x) - f(x)) + (f(x) - T_n(x)) = o((x - x_0)^n) + o((x - x_0)^n) = o((x - x_0)^n)$$

Ne segue che in particolare che  $P_n(x) - T_n(x) = o(1)$  e quindi  $P_n(x) - T_n(x)$  tende a zero. Ma

$$P_n(x) - T_n(x) = f(x_0) - c_0 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k - \sum_{k=1}^n c_k(x - x_0)^k$$

ed osserviamo che  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k - \sum_{k=1}^n c_k(x - x_0)^k \right) = 0$ . Se vogliamo quindi

che  $P_n(x) - T_n(x) = o(1)$ , siamo costretti ad porre  $c_0 = f(x_0)$ . Quindi  $T_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n c_k(x - x_0)^k$ . Se  $n = 0$  la dimostrazione è finita. Sia ora  $n > 1$ . Siccome  $P_n(x) - T_n(x) = o((x - x_0))$ , cioè

si vede scrivendo  $P_n(x) - T_n(x) = \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)}(x - x_0) = \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n}(x - x_0)^n$  allora segue

che  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P_n(x) - T_n(x)}{x - x_0} = 0$  da cui

$$\frac{P_n(x) - T_n(x)}{x - x_0} = (f'(x_0) - c_1) + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^{k-1} - \sum_{k=2}^n c_k(x - x_0)^{k-1}$$

Se vogliamo che il limite sia zero dobbiamo porre  $c_1 = f'(x_0)$ . Quindi  $T_n(x)$  diventa  $f(x_0) +$

$f'(x_0) + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k$ . Possiamo andare avanti sulla stessa falsariga fino ad un  $n$  qualsiasi.

La dimostrazione passa attraverso l'induzione. Supponiamo che per  $0 \leq n \leq n_0 - 1$ ,  $P_n(x)$  è l'unico polinomio che verifica  $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$ . Vogliamo far vedere che  $P_{n_0}(x)$  è l'unico polinomio che verifica  $f(x) - P_{n_0}(x) = o((x - x_0)^{n_0})$ . Per  $n_0 = 1$ , sappiamo che  $P_0(x)$  è l'unico e l'argomento è già stato dato. Supponiamo che  $P_{n_0}(x)$  non sia unico. Per ipotesi abbiamo l'unicità per ogni  $0 \leq n \leq n_0 - 1$ . Un polinomio diverso da  $P_{n_0}(x)$  è dato da

$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n_0-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + c_{n_0}(x - x_0)^{n_0}$  e  $c_{n_0} \neq \frac{1}{n_0!} f^{(n_0)}(x_0)$ . Essendo  $P_{n_0}(x) - T_{n_0}(x) = o((x - x_0)^{n_0})$  abbiamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P_{n_0}(x) - T_{n_0}(x)}{(x - x_0)^{n_0}} = \frac{1}{n_0} f^{(n_0)}(x_0) - c_{n_0} = 0$$

e questo è possibile solo se  $\frac{1}{n_0} f^{(n_0)}(x_0) = c_{n_0}$ . ■

**03/12/2009**

**Proposizione: additività dell'integrale rispetto all'intervallo**

Sia  $f \in \mathcal{R}([a, b])$ . Detto  $c \in [a, b]$  si ha  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  e  $f \in \mathcal{R}([c, b])$  ed inoltre  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ . Viceversa se abbiamo  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  e  $f \in \mathcal{R}([c, b])$  allora  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  e vale la stessa relazione fra gli integrali.

*Dimostrazione.* Cominciamo supponendo che  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  e  $f \in \mathcal{R}([c, b])$ . Sappiamo quindi che

$$\forall \varepsilon \exists P_\varepsilon^{(1)} : S(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(1)}) < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \exists P_\varepsilon^{(2)} : S(P_\varepsilon^{(2)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) < \varepsilon$$

Prendiamo la partizione  $P_\varepsilon = P_\varepsilon^{(1)} \cup P_\varepsilon^{(2)}$  di  $[a, b]$ . Abbiamo  $s(P_\varepsilon) = s(P_\varepsilon^{(1)}) + s(P_\varepsilon^{(2)})$  e  $S(P_\varepsilon) = S(P_\varepsilon^{(1)}) + S(P_\varepsilon^{(2)})$  e

$$0 < S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon) = S(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(1)}) + S(P_\varepsilon^{(2)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) < 2\varepsilon$$

da cui deduciamo che  $f \in \mathcal{R}([a, b])$ . Ora dimostriamo  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

$$s(P_\varepsilon) - S(P_\varepsilon^{(1)}) - S(P_\varepsilon^{(2)}) \leq \int_a^b f(x)dx - \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx \leq S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(2)})$$

D'altra parte

$$s(P_\varepsilon) - S(P_\varepsilon^{(1)}) - S(P_\varepsilon^{(2)}) = s(P_\varepsilon) - S(P_\varepsilon) \quad \text{e} \quad S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) = S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon)$$

da cui

$$-\varepsilon < s(P_\varepsilon) - S(P_\varepsilon) \leq \int_a^b f(x)dx - \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx \leq S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon) < \varepsilon$$

e quindi

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx \right| \leq \varepsilon$$

Supponiamo ora che  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  ossia  $S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon) < \varepsilon$  per una opportuna partizione  $P_\varepsilon$  avente  $n_\varepsilon$  punti. Dobbiamo dimostrare che  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  e  $f \in \mathcal{R}([c, b])$  dove  $c \in [a, b]$ .

Dobbiamo distinguere due casi. Il primo è quello per cui  $c$  è un punto della partizione ossia  $c = x_r$  con  $0 < r < n_\varepsilon$ . Se  $c = x_0 = a$  oppure  $c = x_{n_\varepsilon} = b$  non c'è nulla da dimostrare. In tal caso possiamo scrivere  $P_\varepsilon = P_\varepsilon^{(1)} \cup P_\varepsilon^{(2)}$  dove  $P_\varepsilon^{(1)}$  è una partizione dell'intervallo  $[a, c]$  e  $P_\varepsilon^{(2)}$  dell'intervallo  $[c, b]$ . Abbiamo

$$\begin{aligned} 0 < S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon) &= S(P_\varepsilon^{(1)}) + S(P_\varepsilon^{(2)}) - s(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) = \\ &= S(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(1)}) + S(P_\varepsilon^{(2)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) < \varepsilon \end{aligned}$$

e quindi

$$0 < S(P_\varepsilon^{(1)}) - s(P_\varepsilon^{(1)}) < \varepsilon, \quad 0 < S(P_\varepsilon^{(2)}) - s(P_\varepsilon^{(2)}) < \varepsilon$$

ossia il risultato.

Il secondo caso è quello in cui  $c$  non è un elemento della partizione  $P_\varepsilon$ . In tal caso consideriamo la partizione  $P_\varepsilon \cup \{c\} \doteq \hat{P}_\varepsilon$  e definiamo  $\hat{P}_\varepsilon^{(1)}$ ,  $\hat{P}_\varepsilon^{(2)}$ , le due partizioni degli intervalli  $[a, c]$ , e  $[c, d]$  ottenute considerando i punti della partizione  $\hat{P}_\varepsilon$  che cadono rispettivamente in  $[a, c]$  e  $[c, d]$ . Come prima abbiamo

$$0 < S(\hat{P}_\varepsilon) - s(\hat{P}_\varepsilon) = S(\hat{P}_\varepsilon^{(1)}) - s(\hat{P}_\varepsilon^{(1)}) + S(\hat{P}_\varepsilon^{(2)}) - s(\hat{P}_\varepsilon^{(2)}) \leq S(P_\varepsilon) - s(P_\varepsilon) < \varepsilon$$

in quanto  $\hat{P}_\varepsilon$  è più fine di  $P_\varepsilon$ . Ne segue che

$$0 < S(\hat{P}_\varepsilon^{(1)}) - s(\hat{P}_\varepsilon^{(1)}) < \varepsilon \quad 0 < S(\hat{P}_\varepsilon^{(2)}) - s(\hat{P}_\varepsilon^{(2)}) < \varepsilon$$

ossia  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  e  $f \in \mathcal{R}([c, b])$ . *Fine della dimostrazione*

Qualora ve ne fossero, il seguente esempio serve a fugare i dubbi circa la necessità di considerare partizioni più fini. Sia data la funzione  $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 3, \\ \lambda, & 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$  e si considerino le due partizioni

$P_1 = \{0, 1, 3, 4, 5, 6\}$  e  $P_2 = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, 4, 5, 6\}$ .  $P_2$  ha più punti di  $P_1$  ma  $s(P_1) = \lambda(6 - 4)$  e  $s(P_2) = \lambda(6 - 5)$

**07/12/2009**

Dimostriamo il risultato seguente.

**Proposizione** Sia  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  e sia  $g(x)$  la funzione  $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq \bar{x} \in [a, b] \\ y_0 & x = \bar{x}, \end{cases}$   $y_0 \neq f(\bar{x})$ .

Allora pure  $g \in \mathcal{R}([a, b])$  e  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$

*Dimostrazione* Per ipotesi sappiamo che esiste una partizione  $P_\varepsilon = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b\}$  tale che  $S(P_\varepsilon, f) - s(P_\varepsilon, f) < \varepsilon$ . Sia ora  $\bar{x} \in P_\varepsilon$  ad esempio  $\bar{x} = x_k$ . Consideriamo la partizione più fine  $P'_\varepsilon = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, \bar{x} - \delta, \bar{x}, \bar{x} + \delta, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n = b\}$  ( $\delta$  è arbitrario) e

confrontiamo  $s(P'_\varepsilon, f)$  con  $s(P'_\varepsilon, g)$ .  $s(P'_\varepsilon, g) = \sum_{j=1}^{k-1} m_j(x_j - x_{j-1}) + \left(\inf_{x \in [x_{k-1}, \bar{x} - \delta]} f(x)\right)(\bar{x} - \delta - x_{k-1}) + \left(\inf_{x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x}]}$

$g(x)\right)\delta + \left(\inf_{x \in [\bar{x}, \bar{x} + \delta]} g(x)\right)\delta + \left(\inf_{x \in [\bar{x} + \delta, x_{k+1}]}$

$f(x)\right)(\bar{x} + \delta - x_{k+1}) + \sum_{j=k+1}^n m_j(x_j - x_{j-1})$

Per come è definita, si ha  $s(P'_\varepsilon, f) = \sum_{j=1}^{k-1} m_j(x_j - x_{j-1}) + \left(\inf_{x \in [x_{k-1}, \bar{x} - \delta]} f(x)\right)(\bar{x} - \delta - x_{k-1}) + \left(\inf_{x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x}]}$

$f(x)\right)\delta + \left(\inf_{x \in [\bar{x}, \bar{x} + \delta]} f(x)\right)\delta + \left(\inf_{x \in [\bar{x} + \delta, x_{k+1}]}$

$f(x)\right)(\bar{x} + \delta - x_{k+1}) + \sum_{j=k+1}^n m_j(x_j - x_{j-1})$

e quindi la loro differenza è

$$s(P'_\varepsilon, g) - s(P'_\varepsilon, f) = \left(\inf_{x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x}]} g(x)\right)\delta + \left(\inf_{x \in [\bar{x}, \bar{x} + \delta]} g(x)\right)\delta - \left(\inf_{x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x}]} f(x)\right)\delta - \left(\inf_{x \in [\bar{x}, \bar{x} + \delta]} f(x)\right)\delta$$

Per ipotesi di integrabilità sappiamo che  $-M \leq f(x) \leq M$  e quindi  $-|y_0| - M \leq g(x) \leq M + |y_0|$  da cui

$$|s(P'_\varepsilon, g) - s(P'_\varepsilon, f)| \leq (2M + 2(M + |y_0|))\delta$$

La stessa cosa accade per le somme superiori e quindi possiamo scrivere

$S(P'_\varepsilon, g) - s(P'_\varepsilon, g) = (S(P'_\varepsilon, g) - S(P'_\varepsilon, f)) - (s(P'_\varepsilon, g) - s(P'_\varepsilon, f)) + (S(P'_\varepsilon, f) - S(P'_\varepsilon, f)) < \varepsilon + 4(2M + |y_0|)\delta < 2\varepsilon$  non appena  $\delta < \varepsilon/(4(2M + |y_0|))$  e ricordo che  $\delta$  è arbitrario.

Facciamo ora vedere che  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ .

$s(P'_\varepsilon, f) - S(P'_\varepsilon, g) < \int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx < S(P'_\varepsilon, f) - s(P'_\varepsilon, g)$  per definizione di somme superiori e inferiori. Quindi otteniamo

$$-2\varepsilon - \varepsilon < (s(P'_\varepsilon, f) - s(P'_\varepsilon, g)) + (s(P'_\varepsilon, g) - S(P'_\varepsilon, g)) = s(P'_\varepsilon, f) - S(P'_\varepsilon, g) < \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx < S(P'_\varepsilon, f) - s(P'_\varepsilon, g) = (S(P'_\varepsilon, f) - S(P'_\varepsilon, g)) + (S(P'_\varepsilon, g) - s(P'_\varepsilon, g)) < 2\varepsilon + \varepsilon$$

*Fine della dimostrazione*

**Proposizione** Sia  $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  monotona. Allora  $f$  è integrabile.

*Dimostrazione* Prendiamo una partizione equispaziata in cui il singolo intervallo è  $(b-a)/n$ . La

differenza fra somme superiori e inferiori è  $\sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \frac{b-a}{n} =$

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) < \varepsilon \text{ se } n > \frac{1}{\varepsilon} (b-a)(f(b) - f(a)) \text{ e la dimostrazione è}$$

conclusa. Nel passaggio  $\sum_{k=1}^n (M_k - m_k) = f(b) - f(a)$  abbiamo usato la monotonia che abbiamo supposto crescente.

## 14/12/2009

Si è enunciata la proposizione senza dimostrazione:

Siano  $P(x)$  e  $Q(x)$  due polinomi tali che il grado di  $P$  ( $n$ ) è minore del grado di  $Q$  ( $m$ ). Il rapporto  $P(x)/Q(x)$  è scrivibile come

$$\left( \frac{A_{11}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1n_1}}{(x-a_1)^{n_1}} \right) + \left( \frac{A_{21}}{x-a_2} + \dots + \frac{A_{2n_2}}{(x-a_2)^{n_2}} \right) + \dots + \left( \frac{A_{l1}}{x-a_l} + \dots + \frac{A_{ln_l}}{(x-a_l)^{n_l}} \right) + \left( \frac{C_{11}x + D_{11}}{x^2 + c_1x + d_1} + \dots + \frac{C_{1m_1}x + D_{1m_1}}{(x^2 + c_1x + d_1)^{m_1}} \right) + \left( \frac{C_{21}x + D_{21}}{x^2 + c_2x + d_2} + \dots + \frac{C_{2m_2}x + D_{2m_2}}{(x^2 + c_2x + d_2)^{m_2}} \right) + \dots + \left( \frac{C_{k1}x + D_{k1}}{x^2 + c_kx + d_k} + \dots + \frac{C_{km_k}x + D_{km_k}}{(x^2 + c_kx + d_k)^{m_k}} \right)$$

e  $\sum_{j=1}^l n_j + \sum_{r=1}^k 2m_r$  è pari al grado di  $Q(x)$ .

## 21/12/2009

**Teorema del confronto per integrali impropri.** Sia  $f: [a, b) \rightarrow \mathbf{R}$  tale che  $f \in \mathcal{R}([a, a'])$  per ogni  $a < a' < b$  ( $b$  può essere  $+\infty$ ). Sia inoltre  $g: [a, b) \rightarrow \mathbf{R}$  integrabile in senso improprio e supponiamo che  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  per ogni  $x \in [a, b)$ . Allora anche  $f(x)$  è integrabile in senso improprio. Se invece  $\int_a^b f(x)dx$  diverge, allora diverge pure  $\int_a^b g(x)dx$

*Dimostrazione* Sia  $a \leq \xi \leq b$ . Abbiamo  $F(\xi) = \int_a^\xi f(x)dx \leq \int_a^\xi g(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx = I <$

$+\infty$  (lo studente giustifichi ogni  $\leq$ ). Ne segue che la funzione  $F(\xi)$  è limitata. Essendo anche crescente, ammette limite  $\xi \rightarrow b^-$  ossia esiste l'integrale improprio  $\int_a^b f(x)dx$ . Allo stesso modo

se  $\lim_{\xi \rightarrow b^-} F(\xi) = +\infty$ , allora anche  $\lim_{\xi \rightarrow b^-} \int_a^\xi g(x)dx = +\infty$  *Fine della dimostrazione*

*Domanda 1* Dove si usa il fatto che  $f \in \mathcal{R}([a, a'])$  per ogni  $a < a' < b$ ?

### Criteri sufficienti per gli integrali impropri

**Corollario del teorema del confronto** Sia  $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$  infinitesima,  $f(x) \geq 0$ ,  $f \in \mathcal{R}([a, a'])$  per ogni  $a' > a$ , allora si ha

1) Se  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = l \neq +\infty$  per un qualsiasi  $\alpha > 1$ ,  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  converge

2) Se  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = l \neq 0$  (e quindi  $l > 0$ ) per un qualsiasi  $\alpha \leq 1$ ,  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  non converge

Sia  $f: [a, b) \rightarrow \mathbf{R}$  infinita,  $f \in \mathcal{R}([a, a'])$  per ogni  $a' < b$ , allora si ha

3) Se  $\lim_{x \rightarrow b^-} (x - b)^\alpha f(x) = l \neq +\infty$  per un qualsiasi  $\alpha < 1$ ,  $\int_a^b f(x)dx$  converge

4) Se  $\lim_{x \rightarrow b^-} (x - b)^\alpha f(x) = l \neq 0$  (e quindi  $l > 0$ ) per un qualsiasi  $\alpha \geq 1$ ,  $\int_a^b f(x)dx$  non converge

*Dimostrazione*

1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = l \neq +\infty$  implica che  $f(x) \leq l/x^\alpha$  per  $x \geq x_0$ . Spezzando  $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{x_0} f(x)dx + \int_{x_0}^{+\infty} f(x)dx$  osserviamo che il primo è un normale integrale di Riemann e per il secondo applichiamo il Teorema del confronto essendo  $0 \leq f(x) \leq l/x^\alpha$  e  $\alpha > 1$ .

2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = l \neq 0$  implica che  $l - \varepsilon < x^\alpha f(x) < l + \varepsilon$  definitivamente in  $x$  da cui, essendo  $l > 0$ ,  $f(x) > (l - \varepsilon)/x^\alpha$  e  $l - \varepsilon > 0$  potendo prendere  $\varepsilon$  piccolo a piacere. Quindi dalla seconda parte del Teorema del confronto, essendo  $\alpha \leq 1$ , l'integrale diverge.

3)  $\lim_{x \rightarrow b^-} (x - b)^\alpha f(x) = l \neq +\infty$  implica che  $f(x) \leq l/(x - b)^\alpha$  per  $b - \delta < x < b$ . Spezzando  $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{b-\delta} f(x)dx + \int_{b-\delta}^b f(x)dx$ , osserviamo che il primo è un normale integrale di Riemann e per il secondo applichiamo il Teorema del confronto essendo  $0 \leq f(x) \leq l/(x - b)^\alpha$  e  $\alpha < 1$ .

4)  $\lim_{x \rightarrow b^-} (x - b)^\alpha f(x) = l \neq 0$  implica che  $l - \varepsilon < x^\alpha f(x) < l + \varepsilon$  definitivamente in  $x$  per  $x \rightarrow b^-$  da cui, essendo  $l > 0$ ,  $f(x) > (l - \varepsilon)/(x - b)^\alpha$  e  $l - \varepsilon > 0$  potendo prendere  $\varepsilon$  piccolo a piacere. Quindi dalla seconda parte del Teorema del confronto, essendo  $\alpha \geq 1$ , l'integrale diverge. *Fine della dimostrazione*

I criteri appena enunciati sono sufficienti ma non necessari. Si verifichi infatti che  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$  converge ma 1) non si applica.

• La convergenza si può dimostrare in due modi diversi.

Primo modo. Esiste la primitiva della funzione integranda ossia  $F(x) = -(\ln x)^{-1} + c$  e quindi l'integrale è  $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) - F(2) = 1/(\ln 2)$

Secondo modo. Sostituiamo  $x = e^t$  nell'integrale  $\int_2^A f(x)dx$  ottenendo  $\int_{\ln 2}^{\ln A} t^{-2} dt = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln A}$  e nel limite otteniamo  $1/\ln 2$ .

Il secondo modo va tenuto presente anche perché se si dovesse calcolare  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2(1+x)}$ , la primitiva non sarebbe disponibile e la convergenza non può essere dedotta da 1). Infatti abbiamo  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x(\ln(1+x))^2} = +\infty$  per qualsiasi  $\alpha > 1$ .

La sostituzione precedente condurrebbe a  $\int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{dt}{\ln^2(1+e^t)} = \int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{t^2}{\ln^2(1+e^t)} \frac{dt}{t^2}$  e certamente  $\frac{t^2}{\ln^2(1+e^t)} \frac{1}{t^2} \geq \frac{t^2}{2}$  definitivamente per  $t \rightarrow +\infty$  da cui la divergenza dell'integrale in questione.

• Facciamo vedere ora che  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$  diverge ma 2) non si applica. Anche qui abbiamo la primitiva (privilegio assai raro)  $F(x) = \ln(\ln x)$  e quindi  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) - \ln(\ln 2) = +\infty$ .

La sostituzione di prima porta a  $\int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{dt}{t} = \ln(\ln A) - \ln(\ln 2) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} +\infty$

la 2) non si applica. Infatti abbiamo  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x \ln x} = 0$  per ogni  $\alpha \leq 1$ .

Se avessimo  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln(1+x)}$ , sostituendo avremmo  $\int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{dt}{\ln(1+e^t)}$ . Scriviamo  $\frac{1}{\ln(1+e^t)} = \frac{t}{\ln(1+e^t)} \frac{1}{t} \geq \frac{1}{2t}$  definitivamente in  $t$  e quindi l'integrale diverge.

• Si verifichi che  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$  converge ma 3) non si applica.

Primo modo. La stessa primitiva di prima ci dà  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln \varepsilon)^{-1} + \ln 2 = \ln 2$

Secondo modo. Sostituendo  $y = 1/x$  otteniamo  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_2^{1/\varepsilon} \frac{dy}{y(\ln y)^2}$  ossia lo stesso integrale improprio di prima.

Terzo modo. Sostituiamo  $x = e^t$  e quindi  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\ln \varepsilon}^{-\ln 2} \frac{dt}{t^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{\ln \varepsilon} + \frac{1}{\ln 2} \right) = 1/\ln 2$

Verifichiamo ora che 3) non si applica in quando dovremmo avere  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha}{x(\ln x)^2} = l (\neq +\infty)$  per un certo  $\alpha < 1$  ma questo è impossibile.

• Si verifichi che  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x \ln x}$  diverge ma 4) non si applica. Lascio questa parte agli studenti diligenti.

• Studiamo la convergenza dell'integrale improprio  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x |\ln(x + \sqrt{x})|^a}$  al variare di  $a$ .

Sia  $a > 0$ . Cambiamo variable  $t = \ln x$  ed otteniamo  $\int_{-\infty}^{-\ln 2} \frac{dt}{|\ln(e^t + e^{t/2})|^a}$ . Abbiamo  $\ln(e^t +$

$e^{t/2}) = \ln e^{t/2} + \ln(1 + e^{t/2}) = \frac{t}{2} + \ln(1 + e^{t/2})$  per cui  $|\frac{t}{2} + \ln(1 + e^{t/2})| \geq \frac{|t|}{2} - |\ln(1 + e^{t/2})| \geq \frac{|t|}{4}$  definitivamente per  $t \rightarrow -\infty$  ossia per  $t < t_0 < -\ln 2$  con un certo  $t_0$ . Si noti che  $\ln(1 + e^{t/2})$  tende a zero per  $t \rightarrow -\infty$ . Ne segue  $\int_{-\infty}^{t_0} \frac{dt}{|\ln(e^t + e^{t/2})|^a} \leq \int_{-\infty}^{t_0} \frac{dt}{(|t|/4)^a}$  che converge se  $a > 1$ .

Se invece  $0 < a \leq 1$  allora stimiamo  $|\frac{t}{2} + \ln(1 + e^{t/2})| \leq \frac{|t|}{2} + |\ln(1 + e^{t/2})| \geq |t|$  definitivamente per  $t \rightarrow -\infty$  ossia per  $t < t_1 < -\ln 2$  con un certo  $t_1$ . Ne segue  $\int_{-\infty}^{t_1} \frac{dt}{|\ln(e^t + e^{t/2})|^a} \geq \int_{-\infty}^{t_1} \frac{dt}{|t|^a}$  che diverge se  $a \leq 1$ .

Il criterio sufficiente 3) non si applica alla funzione  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x|\ln(x + \sqrt{x})|^a}$  in quanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha}{x|\ln(x + \sqrt{x})|^a} = +\infty \text{ per qualsiasi valore di } a \text{ se } \alpha < 1.$$

Se  $a = 0$  la funzione vale 1 e quindi l'integrale diverge.

Se  $a < 0$  la funzione diverge a  $+\infty$  e quindi l'integrale improprio diverge.

## 11/01/2010

### **Teorema sulla convergenza di integrali impropri di funzioni non aventi segno definito.**

Sia  $I \subseteq \mathbf{R}$  un intervallo e sia  $f: I \rightarrow \mathbf{R}$  una funzione integrabile secondo Riemann in ogni intervallo chiuso e limitato  $J \subset I$ . Se  $|f|$  è integrabile in senso improprio su  $I$  anche  $f$  lo è ed inoltre

$$\left| \int_I f(x) dx \right| \leq \int_I |f(x)| dx$$

*Dimostrazione* Sia  $f_+ \doteq \frac{1}{2}(f + |f|)$ ,  $f_- = \frac{1}{2}(f - |f|)$  per cui  $f = f_+ + f_-$ . Evidentemente si ha  $f_+ \geq 0$  e  $f_- \leq 0$ . Dimostriamo che tanto  $f_+$  che  $f_-$  sono integrabili in senso improprio e quindi  $f$  è integrabile in senso improprio. Per quanto riguarda  $f_+$  osserviamo che  $0 \leq f_+ \leq \frac{1}{2}(|f| + |f|) = |f|$  ed essendo  $|f|$  integrabile in senso improprio per ipotesi, per il teorema del **21/12/2009**, concludiamo che  $f_+$  è integrabile in senso improprio. Per quanto riguarda  $f_-$  osserviamo che  $-|f| \leq f_- \leq 0$  e quindi ne segue la stessa conclusione. Inoltre abbiamo

$$\begin{aligned} \left| \int_I f(x) dx \right| &= \left| \int_I (f_+(x) + f_-(x)) dx \right| \leq \left| \int_I f_+(x) dx \right| + \left| \int_I f_-(x) dx \right| = \int_I f_+(x) dx + \left| \int_I f_-(x) dx \right| \leq \\ &\leq \int_I f_+(x) dx + \int_I |f_-(x)| dx = \int_I \left( \frac{1}{2}(f + |f|) + \frac{1}{2}(|f| - f) \right) dx = \int_I |f(x)| dx \end{aligned}$$

*Osservazioni* l'estremo sinistro di  $I$  può essere  $-\infty$  e l'estremo destro  $+\infty$ .

- Dimostrazione che  $\int_0^{+\infty} \sin x^\gamma dx$ ,  $\gamma > 1$  converge
- Dimostrazione che  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ , converge

## 13/01/2010

**Dimostrazione che**  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  **diverge.** Scriviamo

$$S_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq 2/4} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4/8} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{\geq 8/16} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{32}\right)}_{\geq 16/32} \geq$$

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)}_{\geq 2^{n-1}/2^n} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{4}{8} + \dots + \frac{2^{n-1}}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(n-1) = 1 + \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$$

Essendo  $S_{n+1} \geq S_n$ , ossia è monotona non decrescente, ne segue che converge al suo estremo superiore. Poiché  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2^n} = +\infty$ ,  $S_n$  diverge a  $+\infty$ .

**Dimostrazione che**  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$  **con**  $p > 1$  **converge.** Sia  $n$  il più piccolo numero intero per cui  $m \leq 2^n - 1$ . Abbiamo

$$S_m = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{m^p} \leq$$

$$= 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}\right)}_{\leq 2/2^p} + \underbrace{\left(\frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{7^p}\right)}_{\leq 4/4^p} + \underbrace{\left(\frac{1}{8^p} + \dots + \frac{1}{15^p}\right)}_{\leq 8/8^p} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{16^p} + \dots + \frac{1}{31^p}\right)}_{\leq 16/16^p} + \dots +$$

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2^{n-1}} + \dots + \frac{1}{2^n - 1}\right)}_{\leq 2^{n-1}/2^{(n-1)p}} \leq 1 + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{4^{p-1}} + \frac{1}{8^{p-1}} + \frac{1}{16^{p-1}} + \dots + \frac{2^{n-1}}{2^{(n-1)p}} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^{k(p-1)}} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{k(p-1)}} = \frac{2^{p-1}}{1 - 2^{p-1}} = \frac{1}{2^{p-1} - 1}$$

Dunque la successione  $\{S_m\}_{m=1}^{\infty}$  è limitata ed essendo non decrescente, converge ad un limite.

Abbiamo leggermente modificato la dimostrazione rispetto al caso precedente in quanto stavolta  $S_{2^n}$  converge e non diverge.  $S_n$  è sempre una successione non decrescente ma la sottosuccessione  $S_{2^n}$  stavolta converge e quindi non siamo più autorizzati a dire che tutta la successione  $S_n$  converge. Si pensi ad esempio alla successione

$$S_n = \left\{1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{6}, 1, \frac{1}{8}, 1, \frac{1}{10}, \dots\right\}$$

In tal caso si ha che  $S_n$  non converge ma la sottosuccessione  $S_{2n}$  converge a zero. Anche la successione  $\{S_{2^n}\}$ , che è una sottosuccessione di  $\{S_n\}$ , converge a zero. La successione  $\{a_n\}$  che genera la  $\{S_n\}$  è data da

$$a_1 = S_1, \quad a_2 = S_2 - S_1, \quad a_3 = S_3 - S_2, \dots, a_n = S_n - S_{n-1}$$

Si è dimostrato il seguente risultato.

**Proposizione** Sia  $\{a_k\}$  una successione tale che  $\sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|$  converge. Allora converge pure la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k.$$

*Dimostrazione* Possiamo scrivere:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon : n, m > n_\varepsilon \implies \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n}^m |a_k| < \varepsilon$$

Il primo  $\leq$  deriva dalle proprietà dei moduli. Il secondo  $\leq$  deriva dalla proprietà di Cauchy delle serie convergenti ossia  $\sum_{k=n}^m |a_k|$ . Ne segue che la proprietà di Cauchy vale anche per  $\{a_k\}$  e

quindi la serie  $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k$  converge.

**14/01/2010**

**Criterio di convergenza di serie tramite confronto con integrali** Sia  $f: [k_0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $k_0 \in \mathbf{Z}$  tale che  $f \geq 0$  e monotona decrescente(crescente). Allora la serie  $\sum_{k=1}^{+\infty} f(k)$  converge se e

solo se converge l'integrale  $\int_{k_0}^{+\infty} f(x)dx$

*Dimostrazione* Un disegno consente subito di scrivere  $\int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x)dx$  e

quindi  $\int_{k_0+1}^{m+1} f(x)dx \leq \sum_{k=k_0+1}^m f(k) \leq \int_{k_0}^m f(x)dx \leq \int_{k_0}^{+\infty} f(x)dx$ . Se  $\int_{k_0}^{+\infty} f(x)dx$  converge la

successione  $\left\{ \sum_{k=k_0+1}^n f(k) \right\}_{n=k_0+1}^{\infty}$  è limitata ed essendo crescente converge al suo estremo superiore che è finito. Se  $\int_{k_0}^{+\infty} f(x)dx = +\infty$  allora la successione  $\left\{ \sum_{k=k_0+1}^{m+1} f(k) \right\}_{m=k_0}^{\infty}$  è illimitata

superiormente e quindi, essendo crescente, diverge a  $+\infty$ .

01/02/2010

## §14 Appendice 6: Le equazioni algebriche di terzo grado a coefficienti reali (una interessante applicazione dei numeri complessi; la formula di Cardano (Pavia 1501 – Roma 1576))

Sia data la equazione algebrica di terzo grado  $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$  i cui coefficienti sono reali. La sostituzione  $z = x + \frac{a}{3}$  trasforma la equazione in  $z^3 + pz + q = 0$  con  $p = b - \frac{1}{3}a^2$ ,  $q = \frac{2}{27}a^3 - \frac{ab}{3} + c$ . Scriviamo  $z = u + v$  ottenendo  $(u + v)^3 + p(u + v) + q = u^3 + v^3 + 3uv(u + v) + p(u + v) + q = 0$ .

A questo punto studiamo il sistema 
$$\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ uv = -\frac{p}{3} \end{cases} \quad \text{ossia} \quad \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27} \end{cases} \quad \text{e se poniamo } u^3 = \xi$$

$v^3 = \eta$  il sistema diventa 
$$\begin{cases} \xi + \eta = -q \\ \xi\eta = -\frac{p^3}{27} \end{cases} .$$
 I numeri  $\xi$  e  $\eta$  sono le soluzioni della equazione di

secondo grado  $\lambda^2 + q\lambda - \frac{p^3}{27} = 0$  ossia  $\lambda_{\pm} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$  e se chiamiamo  $D \doteq \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$  abbiamo  $\lambda_{\pm} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{D}$ . Segue chiaramente che  $u = \lambda_+^{1/3} = (-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}})^{1/3}$  e  $v = \lambda_-^{1/3} = (-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}})^{1/3}$  e bisogna tenere in mente che  $\lambda_+^{1/3}$  dà luogo a tre risultati così come  $\lambda_-^{1/3}$ .

Vanno distinti 3 casi:  $D > 0$ ,  $D < 0$ ,  $D = 0$ . Cominciamo da  $D = 0$  ossia  $\frac{q^2}{4} = -\frac{p^3}{27}$ . La estrazione della radice cubica  $(-\frac{q}{2})^{1/3}$  genera tre soluzioni (due complesse ed una reale) ossia  $u_1 = (-\frac{q}{2})^{1/3}$ ,  $u_2 = e^{i\frac{2}{3}\pi}(-\frac{q}{2})^{1/3}$ ,  $u_3 = e^{-i\frac{2}{3}\pi}(-\frac{q}{2})^{1/3}$ , e la stessa cosa per  $v$  ossia  $v_1 = (-\frac{q}{2})^{1/3}$ ,  $v_2 = e^{i\frac{2}{3}\pi}(-\frac{q}{2})^{1/3}$ ,  $v_3 = e^{-i\frac{2}{3}\pi}(-\frac{q}{2})^{1/3}$ . Ora bisogna ricordare che  $uv = -\frac{p}{3}$  da cui le uniche coppie possibili sono  $(u_1, v_1)$ ,  $(u_2, v_3)$  e  $(u_3, v_2)$ . La soluzione  $z = u + v$  è data da  $z_1 = u_1 + v_1 = -2(\frac{q}{2})^{1/3}$  nel primo caso. Nel secondo caso si ha  $z_2 = u_2 + v_3 = -(\frac{q}{2})^{1/3}(e^{i\frac{2}{3}\pi} + e^{-i\frac{2}{3}\pi}) = -(\frac{q}{2})^{1/3}2\text{Re}(e^{i\frac{2}{3}\pi}) = -(\frac{q}{2})^{1/3}2\cos\frac{2}{3}\pi = (\frac{q}{2})^{1/3}$ . Nel terzo ed ultimo caso si ha  $z_3 = u_3 + v_2 = u_2 + v_3$  da cui si evince che una delle radici è doppia. In conclusione, per  $D = 0$  le radici sono tutte e tre reali ed una è doppia. La seconda è uguale all'opposto della prima. In altre parole  $D = 0$  corrisponde ad un polinomio del tipo  $(x - x_o)^2(x + x_o) = 0$

Proseguiamo con il caso  $D > 0$ .  $u^3 = \lambda_+ = -\frac{q}{2} + \sqrt{D}$  per cui  $u$  può assumere uno dei tre valori  $\lambda_+^{1/3}$ ,  $\lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}$  e  $\lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}$  e  $v$  uno dei tre  $\lambda_-^{1/3}$ ,  $\lambda_-^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}$  e  $\lambda_-^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}$  dove  $\lambda_- = -\frac{q}{2} - \sqrt{D}$ . Dovendo essere  $uv = -\frac{p}{3}$  si hanno le tre possibilità  $(u, v) = (\lambda_+^{1/3}, \lambda_-^{1/3})$ ,  $(u, v) = (e^{i\frac{2}{3}\pi}\lambda_+^{1/3}, e^{-i\frac{2}{3}\pi}\lambda_-^{1/3})$ ,  $(u, v) = (e^{-i\frac{2}{3}\pi}\lambda_+^{1/3}, e^{i\frac{2}{3}\pi}\lambda_-^{1/3})$ . Sommando alla fine si ha  $z_1 = \lambda_+^{1/3} + \lambda_-^{1/3}$ ,  $z_2 = -\frac{1}{2}(\lambda_+^{1/3} + \lambda_-^{1/3}) + i\frac{\sqrt{3}}{2}(\lambda_+^{1/3} - \lambda_-^{1/3})$  e  $z_3 = -\frac{1}{2}(\lambda_+^{1/3} + \lambda_-^{1/3}) - i\frac{\sqrt{3}}{2}(\lambda_+^{1/3} - \lambda_-^{1/3})$  che è il complesso coniugato di  $z_2$ . Si hanno quindi due radici complesse coniugate ed una radice reale.

L'ultimo caso è quello in cui  $D < 0$  per cui  $\lambda_+ = -\frac{q}{2} + i\sqrt{-D} \doteq \rho_o e^{i\vartheta_o}$  ( $\rho_o = \sqrt{\frac{q^2}{4} - D}$  e  $\tan\vartheta_o = \frac{-2\sqrt{-D}}{q}$ ) e  $\lambda_- = -\frac{q}{2} - i\sqrt{-D} = \overline{\lambda_+}$ . Come prima  $u$  può assumere uno dei tre valori  $u_1 = \lambda_+^{1/3}$ ,  $u_2 = \lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}$  e  $u_3 = \lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}$  ( $\lambda_+^{1/3} = \rho_o^{1/3}e^{i\vartheta_o/3}$ ) e  $v$  uno dei tre  $v_1 = \lambda_-^{1/3}$ ,  $v_2 = \lambda_-^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}$  e  $v_3 = \lambda_-^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}$ . La conseguenza è che  $z_1 = u_1 + v_1 = \lambda_+^{1/3} + \lambda_-^{1/3} = \lambda_+^{1/3} + \overline{\lambda_+^{1/3}} = 2\text{Re}(\lambda_+^{1/3}) \in \mathbf{R}$ . La seconda radice è  $z_2 = u_2 + v_2 = \lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi} + \lambda_-^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi} = \lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi} + \overline{\lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}} = 2\text{Re}(\lambda_+^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi}) \in \mathbf{R}$ . La terza radice è  $z_3 = u_3 + v_3 = \lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi} + \lambda_-^{1/3}e^{i\frac{2}{3}\pi} = \lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi} + \overline{\lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}} = 2\text{Re}(\lambda_+^{1/3}e^{-i\frac{2}{3}\pi}) \in \mathbf{R}$  e come si vede tutte e tre le radici sono reali.

Si può notare che se  $D \geq 0$ , sia  $\lambda_+$  che  $\lambda_-$  sono reali e quindi le radici  $(z_1, z_2, z_3)$  che si ottengono

sono facilmente scrivibili come  $z_j = a_j + ib_j$   $j = 1, 2, 3$  ( $b_j = 0$  nel caso di radici reali). Viceversa se  $D < 0$  sia  $\lambda_+$  che  $\lambda_-$  sono numeri complessi coniugati con parte immaginaria non nulla e le radici (**reali**) si ottengono attraverso una formula del tipo  $a^{1/3} \cos(b + \frac{1}{3} \arctan c)$  che può eventualmente essere pari ad un numero semplice (intero relativo oppure razionale). È per questa ragione che a volte la formula delle equazioni di terzo grado (detta *di Cardano*) non è utile quando le radici sono tutte e tre reali.

Se siamo interessati a trovare radici reali e siamo nel caso  $D \geq 0$ , si può fare a meno di sapere cosa sono i numeri complessi in quanto essi non sono necessari (esattamente come accade per le equazioni di secondo grado). Se però l'equazione in questione ha *tre* radici reali e quindi  $D < 0$ , allora non si può fare a meno di usare tali numeri. Ciò rappresentò un serio problema per gli algebristi dei secoli *XV<sup>0</sup>*, *XVI<sup>0</sup>* e *XVII<sup>0</sup>*. Alcuni pensarono che i numeri complessi fossero un fatto accidentale da evitare in qualche modo. Altri, come Eulero, invece li presero sul serio tanto da usarli correntemente con notevole successo <sup>(1.14)</sup>

Per chiarire la questione si può considerare la equazione  $x^3 - 15x - 4 = 0$  che ha  $q = -4$ ,  $p = -15$ ,  $D = -121$ , <sup>(2.14)</sup>  $\lambda_+ = -\frac{q}{2} + \sqrt{-D} = 2 + i11$ . Seguendo la teoria si ottiene immediatamente  $z_1 = 2Re((\sqrt{125}e^{i \arctan \frac{11}{2}})^{1/3}) = 2\sqrt{5} \cos \frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2}$ . A questo punto possono capitare due eventualità. La prima è che  $\frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2}$  sia un angolo noto di cui è facile sapere il coseno. In tal caso il calcolo è finito. La seconda è che la precedente eventualità non accada.

Per sapere quanto vale  $\cos \frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2}$  conviene ricorrere alla formula  $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$  valida per ogni  $x$ . Grazie ad una ben nota formula trigonometrica abbiamo  $\cos 3x = \frac{2}{5\sqrt{5}}$  e quindi dobbiamo risolvere  $4 \cos^3 x - 3 \cos x = \frac{2}{5\sqrt{5}}$ . Tenendo conto che  $x = \frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2}$  e quindi  $\cos x = \cos \frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2} > 0$  e del fatto che il polinomio  $4z^3 - 3z$  è negativo per  $-1 < z < 0$  e positivo per  $0 < z < 1$ , l'unica soluzione possibile è  $\cos x = \frac{2}{\sqrt{5}}$  (soluzione trovata per tentativi) <sup>(3.14)</sup>. A questo punto una soluzione dell'equazione di partenza è  $z_1 = 2\sqrt{5} \frac{2}{\sqrt{5}} = 4$ .

Trovare  $z_2$  e  $z_3$  è ora immediato. Sempre in base alla teoria precedente si ha

$$z_2 = 2Re(\lambda_+^{1/3} e^{i \frac{2}{3} \pi}) = 2\sqrt{5} \cos(\frac{1}{3} \arctan \frac{11}{2} + \frac{2}{3} \pi) = 2\sqrt{5}(\frac{2}{\sqrt{5}}(-\frac{1}{2}) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{1 - \frac{4}{5}}) = \sqrt{3} - 2,$$

$$z_3 = -\sqrt{3} - 2.$$

$x^3 - 7x + 6 = 0$  che ha come radici  $1, 2, -3$ . Abbiamo  $\lambda_+ = -3 + \sqrt{-\frac{100}{27}} = -3 + i \frac{10}{3\sqrt{3}} = \rho_o e^{i\theta_o}$  dove  $\rho_o = (\frac{343}{27})^{1/2}$ ,  $\theta_o = -\arctan \frac{10}{9\sqrt{3}} + \pi$  e quindi alla fine le tre radici sono date da  $z_1 = 2(\frac{343}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan \frac{10}{9\sqrt{3}} + \frac{\pi}{3})$ ,  $z_2 = 2(\frac{343}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan \frac{10}{9\sqrt{3}} + \pi)$ ,  $z_3 = 2(\frac{343}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan \frac{10}{9\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3})$ . Procedendo come prima, se indichiamo  $x_o = -\frac{1}{3} \arctan \frac{10}{9\sqrt{3}} + \frac{\pi}{3}$  ed usiamo la solita equazione per  $\cos 3x$  otteniamo  $4(\cos x_o)^3 - 4 \cos x_o = -\frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{343}}$ . Cerchiamo  $\cos x_o = \frac{d}{\sqrt{343}}$  da cui otteniamo  $\frac{4d^3}{343} - 3d = -9\sqrt{3}$  e scrivendo  $d = 7\sqrt{3}c$  si ha  $12c^3 - 21c = -9$  ossia  $c = 1$ . A questo punto è immediato avere  $\cos x_o = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$  e quindi  $z_1 = 2$ .  $z_2$  e  $z_3$  seguono immediatamente.

<sup>(1.14)</sup> La fonte è il bel libro (per la cui lettura è sufficiente il bagaglio matematico della scuola superiore) di William Dunham: *Euler The Master of Us All*, The Mathematical Association of America, Dolciani Mathematical Expositions No.22, 1999

<sup>(2.14)</sup> In casi come questo nei quali è facile trovare per tentativi una soluzione,  $x=4$  nella fattispecie, è superfluo usare la formula generale in quanto attraverso Ruffini si può scomporre il polinomio come prodotto di  $(x-4)$  per una polinomio di secondo grado le cui radici sono facilmente ottenibili

<sup>(3.14)</sup> Si tenga presente che l'equazione  $4z^3 - 3z = \alpha$  ha tre soluzioni reali  $z_1, z_2, z_3$  per  $-1 \leq \alpha \leq 1$ . Ciascuna delle soluzioni verifica la relazione  $-1 \leq z_i \leq 1$ .

Un altro esempio del genere è dato dalla equazione  $x^3 - 19x + 30 = 0$  che ha come radici  $2, 3, -5$ . Applicando la formula che dà  $z_1$  otteniamo  $2Re(\lambda_+)^{1/3}$  dove  $\lambda_+ = \rho_o e^{i\vartheta_o} = -15 + \sqrt{225 - \frac{6859}{27}}$   
 $\rho_o = \sqrt{\frac{5291}{27}}$  e  $\tan \vartheta_o = (-\frac{1}{15} \sqrt{\frac{784}{27}})$ . Ne consegue che  $z_1 = 2(\frac{6859}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan(\frac{1}{15} \sqrt{\frac{784}{27}}) + \frac{\pi}{3})$ ,  $z_2 = 2(\frac{6859}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan(\frac{1}{15} \sqrt{\frac{784}{27}}) + \pi)$ ,  $z_3 = 2(\frac{6859}{27})^{1/6} \cos(-\frac{1}{3} \arctan(\frac{1}{15} \sqrt{\frac{784}{27}}) - \frac{\pi}{3})$  sono le radici della equazione. La solita formula dei coseni dà  $4y^3 - 3y = -\frac{45}{19} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$  dove  $y = \cos(-\frac{1}{3} \arctan(\frac{1}{15} \sqrt{\frac{784}{27}}) + \frac{\pi}{3})$  da cui  $y = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$  e quindi  $z_1 = 2$

Come esercizio ci si può divertire a trovare le radici delle seguenti equazioni  
 $x^3 - 6x + 9 = 0$ ,  $x^3 + 12x + 63 = 0$ ,  $x^3 + 9x^2 + 18x + 28 = 0$ ,  $x^3 + 6x^2 + 30x + 25 = 0$ ,  
 $x^3 - 6x + 4 = 0$ ,  $x^3 + 6x + 2 = 0$ ,  $x^3 + 18x + 15 = 0$ ,  $x^3 - 3x^2 - 3x + 11 = 0$ ,  
 $x^3 + 3x^2 - 6x + 4 = 0$ ,  $x^3 + 9x - 26 = 0$ ,  $x^3 + 24x - 56 = 0$ ,  $x^3 + 45x - 98 = 0$ ,  
 $x^3 + 3x^2 - 3x - 1 = 0$ ,  $x^3 - 6x^2 + 57x + 196 = 0$ ,  $x^3 - 4x - 1 = 0$ ,  
 $x^3 - 4x + 2 = 0$ ,  $x^3 - 3abx + a^3 + b^3 = 0$ ,  $x^3 - 3abfgx + f^2ga^3 + fg^2b^3 = 0$ .

## Soluzione delle equazioni di quarto grado di Eulero e di G. Ferrari

### Soluzione Eulero

Sia data la equazione  $y^4 + a'y^3 + b'y^2 + c'y + d' = 0$ . Attraverso la sostituzione  $y = x - \frac{a'}{4}$  essa diventa  $x^4 - ax^2 - bx - c = 0$  con  $a, b$  e  $c$  opportuni. Cerchiamo soluzioni della forma  $x = \sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$ . Elevando al quadrato si ottiene  $x^2 - (p + q + r) = 2(\sqrt{pq} + \sqrt{pr} + \sqrt{qr})$  ed elevando ancora al quadrato si ha  $x^4 - 2(p + q + r)x^2 + (p + q + r)^2 = 4(pq + pr + qr) + 8(\sqrt{p^2qr} + \sqrt{pq^2r} + \sqrt{pqr^2}) = 4(pq + pr + qr) + 8\sqrt{pqr}x$ . Se indichiamo  $f = p + q + r$ ,  $g = pq + pr + qr$ , e  $h = pqr$ , l'ultima equazione può essere riscritta come  $x^4 - 2fx^2 - 8\sqrt{h}x - (4g - f^2) = 0$  che è uguale a  $x^4 - ax^2 - bx - c = 0$  non appena si pone  $a = 2f$ ,  $b = 8\sqrt{h}$ ,  $c = 4g - f^2$ . Dai coefficienti  $(a, b, c)$  si passa ai valori  $(f, g, h)$  e viceversa. Il punto chiave è ora riconoscere che l'equazione di terzo grado  $(z - p)(z - q)(z - r) = 0$  diventa  $z^3 - (p + q + r)z^2 + (pq + pr + qr)z - pqr = 0$  e quindi  $z^3 - fz^2 + gz - h = 0$ . Dunque la procedura prevede che dai coefficienti  $(a, b, c)$  si ricavino  $(f, g, h)$  e da essi si risolva l'equazione  $z^3 - fz^2 + gz - h = 0$ . La soluzione è data dalla terna  $(p, q, r)$  e da essa si ricavano i valori di  $x$ . Ciò implica che bisogna risolvere l'ultima equazione di terzo grado i cui coefficienti si ricavano da  $a, b, c$ . Tra l'altro si può notare come per risolvere una equazione di 4<sup>o</sup> grado se ne risolve una di terzo grado (fatto non sorprendente se si pensa che per risolvere quelle di terzo grado se ne è risolta una di secondo grado e per risolvere quelle di secondo grado se ne risolve una di primo grado).

### Soluzione di G. Ferrari

Partiamo sempre da  $y^4 + ay^3 + by^2 + cy + d = 0$  ed attraverso la sostituzione  $y = x - \frac{a}{4}$  ci si riduce a  $x^4 + px^2 + qx + r = 0$ . Introducendo un parametro ausiliario  $\alpha$  la si riscrive come

$$(x^2 + \frac{p}{2} + \alpha)^2 - [2\alpha x^2 - qx + (\alpha^2 + p\alpha - r + \frac{p^2}{4})] = 0.$$

Si determina ora  $\alpha$  in modo che il polinomio di secondo gradi in parentesi quadre abbia una radice doppia e quindi il suo discriminante deve essere nullo. Si deve avere quindi  $q^2 - 8\alpha(\alpha^2 + p\alpha - r + \frac{p^2}{4}) = 0$ . Quest'ultima è una equazione di terzo grado che sappiamo risolvere e sia  $\alpha_o$  una sua soluzione. Per tale valore lo zero doppio è  $\frac{q}{4\alpha_o}$  e quindi l'equazione diventa  $(x^2 + \frac{p}{2} + \alpha_o)^2 - 2\alpha_o(x - \frac{q}{4\alpha_o})^2 = 0$ . Quest'ultima equazione è equivalente al sistema  $x^2 - \sqrt{2\alpha_o}x + (\frac{p}{2} + \alpha_o + \frac{q}{2\sqrt{2\alpha_o}}) = 0$ ,  $x^2 + \sqrt{2\alpha_o}x + (\frac{p}{2} + \alpha_o - \frac{q}{2\sqrt{2\alpha_o}}) = 0$ ,

Per le equazioni di quinto grado, intorno al 1824, il matematico norvegese Niels Abel (1802–1829) dimostrò che non è possibile arrivare ad una soluzione in termini di radicali ed operazioni elementari. Lo stesso risultato vale per le equazioni di grado superiore.